UNIONE EUROPEA
«Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE CALABRIA

PSR 2014 2020 CALABRIA

PROVINCIA di COSENZA
provincia.cs.it

Comune di Montalto Uffugo

REGIONE CALABRIA – PSR 2014-2020 – MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE FORESTE

Intervento 8.5.1. – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE DELLE PROPRIETA' SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS)
Periodo di validità 2021-2033



ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DELLE UNITA' COLTURALI

IL TECNICO
DOTTORE FORESTALE ANDREA BELLUSCI

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
N. 514
SEZ. A
Prov. CS
DOTTORE FORESTALE
ANDREA
BELLUSCI

ALLEGATO 1

Descrizione delle Unità Colturali

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Li Murgi-Cozzo Cervello*	24.93		24.93	**1**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1196	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ SO ☐ NE	0	37
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Dystrudepts - Humic Distrudept (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul *60* % Insufficiente sul 40 %

Classe colturale *Boschi di Faggio*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*				
%	*100*				

Necromassa in piedi ☒ SI ☐ NO — Specie: *Faggio* — **Necromassa a terra** ☒ SI ☐ NO ☒ 1/3 della sup. ☐ 2/3 della sup. ☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Assente

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 100 % ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☒ NO Chiarie ☐ SI ☒ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Fagus sylvatica*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione — **Età (2021)** *>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☒ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☐ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Non si hanno notizie della gestione passata*

Indirizzo selvicolturale *Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato.*

Ipotesi d'intervento *Taglio colturale*

Priorità ☐ 1° periodo ☒ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Li Murgi-Cozzo Cervello*	32.77		32.77	**2**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1185	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ SO ☐ NE	0	44
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Dystrudepts - Humic Distrudept (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul 60 % Insufficiente sul 40 %

Classe colturale *Boschi di Faggio*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*				
%	*100*				

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Assente

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 100 % ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☒ NO Chiarie ☐ SI ☒ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Fagus sylvatica*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione **Età (2021)** *>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☒ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Non si hanno notizie della gestione passata*

Indirizzo selvicolturale *Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento *Taglio colturale*

Priorità ☐ 1° periodo ☒ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Li Murgi*	10.63		10.63	**3**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☐ Crinale	☐ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
978	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ SO ☐ NE	0	17
	☐ Pianura	☐ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Dystrudepts - Humic Distrudept (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul *100* % Insufficiente sul *0* %

Classe colturale *Boschi di Castagno*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Castanea Sativa*				
%	*100*				

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Castagno*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Agrifoglio

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 100% ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☒ NO Chiarie ☐ SI ☒ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Castanea sativa*	☐ Assente ☒ Sporadica ☐ Diffusa	☐ Coperto ☒ Buche ☐ Margine	☒ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente ☐ Sporadica ☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente ☐ Sporadica ☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente ☐ Sporadica ☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☒ Agamica ☐ Bosco di neoformazione **Età (2021)** *16*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☐ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Perpetuazione del governo a ceduo matricinato con ultimo intervento nel 2004*

Indirizzo selvicolturale *Mantenimento del governo a ceduo matricinato*

Ipotesi d'intervento *Ceduazione con rilascio di matricine*

Priorità ☐ 1° periodo ☒ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Zaghella*	36.53		36.53	**4**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1091	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	3	38
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Dystrudepts - Humic Distrudept (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul *30* % Insufficiente sul *70* %

Classe colturale *Boschi di Faggio*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*				
%	*100*				

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
assente

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 100 % ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☒ NO Chiarie ☐ SI ☒ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Fagus sylvatica*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione **Età (2021)** *>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☒ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Non si hanno notizie della gestione passata*

Indirizzo selvicolturale *Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento *Taglio colturale*

Priorità ☒ 1° periodo ☐ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Cannavo*	38.56		38.56	**5**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
1097	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN 4	MAX 40
	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE		
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Distrudept (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità:	Buona sul *30* % Insufficiente sul 70 %
Classe colturale	*Boschi di Faggio e Ontano nero*
Struttura somatica:	☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*	*Alnus glutinosa*			
%	*80*	*20*			

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
assente

Piante monumentali >80 cm	☐ SI ☒ NO	n.:	Specie:

Grado di copertura	100 %	☒ Regolare	☐ Irregolare	Buche ☐ SI ☒ NO	Chiarie ☐ SI ☒ NO

Rinnovazione naturale							
Specie 1: *Fagus sylvatica*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2: *Alnus glutinosa*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente	☒ Produzione legnosa	☐ Protezione idrogeologica
	☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne	☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
	☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc	☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco	☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione	**Età (2021)**	*>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto	☐ Erosione superficiale	☐ Rotolamento massi	
	☐ Erosione incanalata	☐ Frane superficiali	☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti	☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi ☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri ☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto
Gestione passata	*Non si hanno notizie della gestione passata*
Indirizzo selvicolturale	*Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*
Ipotesi d'intervento	*Taglio colturale*
Priorità	☒ 1° periodo ☐ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Croce di Paola/Montalto*	24.82		24.82	**6**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1075	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	9	47
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Dystrudepts - Humic Distrudept (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità:	Buona sul *60* %	Insufficiente sul *40* %

Classe colturale	*Boschi di Faggio*

Struttura somatica:	☒ Mono-plana	☐ Bi-plana	☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*				
100 %					

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Pungitopo, Agrifoglio, Euforbia

Piante monumentali >80 cm	☐ SI ☒ NO	n.:	Specie:

Grado di copertura	100 %	☒ Regolare	☐ Irregolare	Buche ☐ SI ☒ NO	Chiarie ☐ SI ☒ NO

Rinnovazione naturale						
Specie 1: *Fagus sylvatica*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☒ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente		
	☒ Produzione legnosa	☐ Protezione idrogeologica
	☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne	☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
	☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc	☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco	☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione	Età (2021)	*>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto			
	☐ Erosione superficiale	☐ Rotolamento massi	
	☐ Erosione incanalata	☐ Frane superficiali	☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti	
	☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
	☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
	☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata	*Non si hanno notizie della gestione passata*

Indirizzo selvicolturale	*Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento	*Taglio colturale*

Priorità	☒ 1° periodo	☐ 2° periodo	☐ Differibile	☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Croce di Paola/Montalto*	23.55		23.55	**7**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1038	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	7	42
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità:	Buona sul *40* %	Insufficiente sul *60* %

Classe colturale	*Boschi di Faggio e Ontano nero*

Struttura somatica:	☒ Mono-plana	☐ Bi-plana	☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*	*Alnus glutinosa*			
%	*92*	*8*			

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Agrifoglio, Pungitopo

Piante monumentali >80 cm	☐ SI ☒ NO	n.:	Specie:

Grado di copertura	100 %	☒ Regolare	☐ Irregolare	Buche ☐ SI ☒ NO	Chiarie ☐ SI ☒ NO

Rinnovazione naturale							
Specie 1:	*Fagus silvatyca*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 2:		☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:		☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:		☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente		
	☒ Produzione legnosa	☐ Protezione idrogeologica
	☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne	☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
	☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc	☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco	☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☒ Agamica ☐ Bosco di neoformazione	Età (2021)	*>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto			
	☒ Erosione superficiale	☐ Rotolamento massi	
	☐ Erosione incanalata	☐ Frane superficiali	☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☐ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata	*Non si hanno notizie della gestione passata*

Indirizzo selvicolturale	*Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento	*Taglio colturale*

Priorità	☒ 1° periodo	☐ 2° periodo	☐ Differibile	☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Vallone Petina*	21.33		21.33	**8**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☐ Crinale	☐ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
912	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	0	16
	☐ Pianura	☐ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità:	Buona sul 90%	Insufficiente sul 10%

Classe colturale	*Boschi di Faggio, Ontano nero e Conifere miste*

Struttura somatica:	☒ Mono-plana	☐ Bi-plana	☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*	*Ontano nero*	*Conifere*		
%	*80*	*15*	*5*		

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Agrifoglio, Pungitopo, Euforbia

Piante monumentali >80 cm	☐ SI ☒ NO	n.:	Specie:

Grado di copertura	90 %	☒ Regolare	☐ Irregolare	Buche ☐ SI ☒ NO	Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale							
Specie 1:	*Fagus sylvatica*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2:	*Alnus glutinosa*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	*Conifere miste*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:		☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente		
	☒ Produzione legnosa	☐ Protezione idrogeologica
	☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne	☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
	☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc	☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco	☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione	Età (2021)	*>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto			
	☐ Erosione superficiale	☐ Rotolamento massi	
	☐ Erosione incanalata	☐ Frane superficiali	☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti	
	☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
	☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☒ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
	☒ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata	*Non si hanno notizie sulla gestione passata*

Indirizzo selvicolturale	*Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento	*Taglio colturale*

Priorità	☐ 1° periodo	☒ 2° periodo	☐ Differibile	☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Fangale*	31.60		31.60	**9**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1046	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	0	37
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità:	Buona sul *90* %	Insufficiente sul *10* %

Classe colturale	*Boschi di Faggio, Pino laricio, Ontano nero*

Struttura somatica:	☒ Mono-plana	☐ Bi-plana	☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*	*Pinus nigra*	*Alnus glutinosa*		
%	*95*	*3*	*2*		

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Pungitopo, Agrifoglio, Euforbia

Piante monumentali >80 cm	☐ SI ☒ NO	n.:	Specie:

Grado di copertura	100 %	☒ Regolare	☐ Irregolare	Buche ☐ SI ☐ NO	Chiarie ☐ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale							
Specie 1: *Fagus sylvatica*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche	☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche	☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche	☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche	☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente		
	☒ Produzione legnosa	☐ Protezione idrogeologica
	☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne	☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
	☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc	☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco	☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☒ Agamica ☐ Bosco di neoformazione	Età (2021)	*>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto			
	☐ Erosione superficiale	☐ Rotolamento massi	
	☐ Erosione incanalata	☐ Frane superficiali	☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti	
	☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
	☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
	☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata	*Non si hanno notizie sulla gestione passata*

Indirizzo selvicolturale	*Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento	*Taglio colturale*

Priorità	☒ 1° periodo	☐ 2° periodo	☐ Differibile	☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Fangale*	24.38		24.38	**10**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☐ Crinale	☐ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
912	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	3	24
	☐ Pianura	☐ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul *90* % Insufficiente sul *10* %

Classe colturale *Boschi di Faggio, Conifere miste*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*	*Conifere miste*			
%	*92*	*8*			

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Agrifoglio, Pungitopo

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 95% ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☐ NO Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Fagus sylvatica*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 2: *Conifere miste*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione **Età (2021)** *>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☐ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Non si hanno notizie della gestione passata*

Indirizzo selvicolturale *Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento *Taglio colturale*

Priorità ☒ 1° periodo ☐ 2° periodo Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Bosco Stefanello*	29.13		29.13	**11**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1056	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	4	40
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità:	Buona sul *50* %	Insufficiente sul *50* %

Classe colturale	*Boschi di Faggio*

Struttura somatica:	☒ Mono-plana	☐ Bi-plana	☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*				
%	*100*				

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Agrifoglio, Pungitopo

Piante monumentali >80 cm	☐ SI ☒ NO	n.:	Specie:

Grado di copertura	90 %	☒ Regolare	☒ Irregolare	Buche ☐ SI ☐ NO	Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale						
Specie 1: *Fagus sylvatica*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente		
	☒ Produzione legnosa	☐ Protezione idrogeologica
	☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne	☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
	☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc	☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco	☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione	Età (2021)	*>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto			
	☐ Erosione superficiale	☐ Rotolamento massi	
	☐ Erosione incanalata	☐ Frane superficiali	☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti	
	☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
	☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
	☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata	*Non si hanno notizie sulla gestione passata*

Indirizzo selvicolturale	*Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento	*Taglio colturale*

Priorità	☒ 1° periodo	☐ 2° periodo	☐ Differibile	☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Cozzo Petina*	25.21		25.21	**12**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☐ E ☒ O	MIN	MAX
1012	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	6	46
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità:	Buona sul *20* %	Insufficiente sul *80* %

Classe colturale	*Boschi di Faggio*

Struttura somatica:	☒ Mono-plana	☐ Bi-plana	☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*	*Castanea sativa*			
%	*90*	*10*			

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Agrifoglio, Pungitopo

Piante monumentali >80 cm	☐ SI ☒ NO	n.:	Specie:

Grado di copertura	80 %	☒ Regolare	☒ Irregolare	Buche ☒ SI ☐ NO	Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale							
Specie 1: *Fagus sylvatica*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 2: *Castanea sativa*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente		
	☒ Produzione legnosa	☐ Protezione idrogeologica
	☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne	☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
	☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc	☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco	☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☒ Agamica ☐ Bosco di neoformazione	Età (2021)	*40*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto			
	☐ Erosione superficiale	☐ Rotolamento massi	
	☐ Erosione incanalata	☐ Frane superficiali	☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti	
	☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
	☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☐ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
	☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata	*Ceduo semplice matricinato*

Indirizzo selvicolturale	*Mantenimento del ceduo matricinato*

Ipotesi d'intervento	*Ceduazione con rilascio di matricine*

Priorità	☐ 1° periodo	☒ 2° periodo	☐ Differibile	☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Cozzo Petina*	28.98		28.98	**13**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☐ E ☒ O	MIN	MAX
924	☐ Impluvio	☒ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	3	44
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità:	Buona sul *20* %	Insufficiente sul *80* %

Classe colturale	*Boschi di Faggio*

Struttura somatica:	☒ Mono-plana	☐ Bi-plana	☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*				
%	*100*				

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Agrifoglio, Pungitopo

Piante monumentali >80 cm	☐ SI ☒ NO	n.:	Specie:

Grado di copertura	80 %	☐ Regolare	☒ Irregolare	Buche ☒ SI ☐ NO	Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale							
Specie 1: *Fagus sylvatica*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche	☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche	☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche	☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto	☐ Buche	☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente		
	☒ Produzione legnosa	☐ Protezione idrogeologica
	☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne	☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
	☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc	☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco	☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☒ Agamica ☐ Bosco di neoformazione	Età (2021)	*40*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto			
	☐ Erosione superficiale	☐ Rotolamento massi	
	☐ Erosione incanalata	☐ Frane superficiali	☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti	
	☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
	☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☐ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
	☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata	*Ceduo semplice matricinato*

Indirizzo selvicolturale	*Mantenimento del ceduo matricinato*

Ipotesi d'intervento	*Ceduazione con rilascio di matricine*

Priorità	☒ 1° periodo	☐ 2° periodo	☐ Differibile	☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Cozzarello*	27.34		27.34	**14**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1015	☐ Impluvio	☐ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	8	39
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul *30* % Insufficiente sul *70* %

Classe colturale *Boschi di Faggio*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*				
%	*100*				

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
assente

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 90 % ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☒ NO Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Fagus sylvatica*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione **Età (2021)** *>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☐ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Non si hanno notizie sulla gestione passata*

Indirizzo selvicolturale *Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento *Taglio colturale*

Priorità ☐ 1° periodo ☒ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Bosco Berarda*	31.87		31.87	**15**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1085	☐ Impluvio	☐ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	9	38
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul *20* % Insufficiente sul *80* %

Classe colturale *Boschi di Faggio*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*				
%	*100*				

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
Agrifoglio, Pungitopo

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 90 % ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☐ NO Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Fagus sylvatica*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 2:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☐ Agamica ☐ Bosco di neoformazione **Età (2021)** *>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☐ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Non si hanno notizie sulla gestione passata*

Indirizzo selvicolturale *Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento *Taglio colturale*

Priorità ☐ 1° periodo ☒ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Pietre Lucenti*	20.08		20.08	**16**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
1025	☐ Impluvio	☐ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☐ NE	6	33
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul *50* % Insufficiente sul *50* %

Classe colturale *Boschi di Faggio, Ontano nero, Cerro, Pino laricio*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Fagus sylvatica*	*Alnus glutinosa*	*Quercuscerris*	*Pinus*	
%	*60*	*10*	*20*	*10*	

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Faggio*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
assente

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 90 % ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☐ NO Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Fagus sylvatica*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 2: *Alnus glutinosa*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3: *Quercus cerris*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4: *Pinus nigra*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☒ Agamica ☐ Bosco di neoformazione **Età (2021)** *>60*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☐ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Non si hanno notizie sulla gestione passata*

Indirizzo selvicolturale *Favorire il bosco a struttura multiplana a rinnovazione naturale, mediante interventi di taglio modulare sulle aree a fustaia e avviamento ad alto fusto nelle aree a ceduo fortemente invecchiato*

Ipotesi d'intervento *Taglio colturale*

Priorità ☐ 1° periodo ☒ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE

Comune	Località	Sup. for. (Ha)	Sup. improdut. (Ha)	Sup. TOT (Ha)	UC
Montalto Uffugo	*Acqua del Faggio*	13.58		13.58	**17**

Altitudine med. (m)	Giacitura		Esposizione	Pend. (%)	
	☒ Crinale	☒ Alto ver.	☐ N ☐ S ☒ E ☐ O	MIN	MAX
952	☐ Impluvio	☐ Basso ver.	☐ NO ☐ SO ☐ NO ☒ NE	5	31
	☐ Pianura	☒ Medio ver.	☐ NULLA		

Geologia (Carta Geologica d'Italia)	Pedologia (ARSSA 2003)
Graniti e granodioriti	*Humic Dystroxerepts (Soil Taxonomy, 1999)*

Accessibilità: Buona sul *70* % Insufficiente sul *30* %

Classe colturale *Boschi di Castagno, Faggio*

Struttura somatica: ☒ Mono-plana ☐ Bi-plana ☐ Multi-plana

Composizione specifica strato arboreo	1	2	3	4	5
Specie	*Castanea sativa*	*Fagus sylvatica*			
%	*80*	*20*			

Necromassa in piedi	Specie	Necromassa a terra			
☒ SI ☐ NO	*Castagno*	☒ SI ☐ NO	☒ 1/3 della sup.	☐ 2/3 della sup.	☐ Intera sup.

Composizione specifica strato arbustivo e/o erbaceo
assente

Piante monumentali >80 cm ☐ SI ☒ NO n.: Specie:

Grado di copertura 90 % ☒ Regolare ☐ Irregolare Buche ☐ SI ☐ NO Chiarie ☒ SI ☐ NO

Rinnovazione naturale

Specie 1: *Fagus sylvatica*	☐ Assente	☒ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☒ Insufficiente
Specie 2: *Castanea sativa*	☒ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 3:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
Specie 4:	☐ Assente	☐ Sporadica	☐ Diffusa	☐ Coperto ☐ Buche ☐ Margine	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente

Funzione prevalente
☒ Produzione legnosa
☐ Altre produzioni: sughero, pinoli, castagne
☐ Prodotti secondari: funghi, tartufi, miele, ecc
☐ Protezione idrogeologica
☐ Funzione naturalistica e/o conservativa
☐ Funzione ricreativa

Origine del bosco ☒ Naturale (disseminazione naturale) ☐ Artificiale ☒ Agamica ☐ Bosco di neoformazione **Età (2021)** *30*

Disturbi	Animali domestici	Selvatici	Insetti e funghi	Agenti meteorici	Incendi	Tagli	Attività turistiche ricreative	Altro
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dissesto
☐ Erosione superficiale
☐ Erosione incanalata
☐ Rotolamento massi
☐ Frane superficiali
☐ Altri fattori di dissesto

Opere e manufatti
☐ ASSENTI; ☒ Strade, piste; ☐ Edifici ☐ Sistemazioni ☐ Gradonamenti ☐ Muri, recinti ☐ Elettrodotti ☐ Parcheggi
☐ Linee elettriche ☐ Pozzetti ☐ Laghetti artificiali ☐ Viali parafuoco ☒ Piazzali carico/scarico ☐ Sentieri
☐ Aree attrezzate ☐ Altro metanodotto

Gestione passata *Perpetuazione del governo a ceduo*

Indirizzo selvicolturale *Ceduo matricinato*

Ipotesi d'intervento *Taglio colturale*

Priorità ☒ 1° periodo ☐ 2° periodo ☐ Differibile ☐ Subordinato alla validità

NOTE